

# El salpullido y el nevirapine de PI Perspective 27



Traducido y adaptado al español por Luis David Merino

## El salpullido causado por el nevirapine afecta a cada sexo en forma distinta

Reimpreso de  
PI Perspective #27, abril 1999

Un estudio reportado en la reciente conferencia llevada a cabo en Chicago sugiere que las mujeres están más predispuestas a desarrollar salpullidos, especialmente los de mayor gravedad, como efecto secundario del medicamento contra el VIH nevirapine, en comparación con los hombres. Los investigadores estudiaron las historias clínicas de 85 mujeres y 176 hombres que tomaban regularmente regímenes con nevirapine entre septiembre del 93 y septiembre del 98. En total, 26 personas desarrollaron salpullidos dentro de los primeros 90 días de haber comenzado a tomar el medicamento, de las cuales 12 eran mujeres. Los salpullidos leves se observaron en 4 mujeres y 13 hombres, mientras que los más severos se observaron en 8 mujeres y 1 hombre.

En este estudio, parecía más probable que los salpullidos se presentaran en las personas con recuentos de CD4+ más altos (es decir, mayores de 200), pero no se notó ninguna diferencia por motivo de la edad, la raza o el uso concurrente de otros medicamentos. En otros estudios sobre el nevirapine, los salpullidos severos se habían observado en los hombres, así es que no se sabe a ciencia cierta si esta cifra pudiera ser también aplicable para las mujeres.

Estos descubrimientos recientes destacan la necesidad de incluir un mayor número de mujeres en los estudios sobre nuevas terapias, para cuando se presenten diferencias debidas a la diferencia de sexo, éstas sean detectadas desde los resultados de los estudios iniciales. Por otro lado, también sugieren que las mujeres que usan nevirapine deben tener especial precaución en observar el desarrollo de un salpullido y posiblemente utilizar una medicación preventiva, como podría ser el Benadril®, para minimizar así los riesgos. Es una práctica común que cuando se utiliza el nevirapine para comenzar la terapia, a la mitad de la dosis, se tomen medidas durante las primeras semanas para minimizar los riesgos de un salpullido. Con base en esta nueva información, esta práctica resulta de mucho mayor importancia para las mujeres que para los hombres.

### Project Inform On Line!

Los servicios y publicaciones de Project Inform están disponibles en Internet. Puede contactar el website de Project Inform en:

[www.projectinform.org](http://www.projectinform.org)

### Otras Publicaciones PI

Project Inform (PI) ha desarrollado más de cien publicaciones. Estas incluyen Fact Sheets, Material de Discusión, Cartillas, y PI Perspective (el periódico de Project Inform). Todos ellos han sido diseñados para ofrecer la información sobre las terapias médicas, los avances de las investigaciones y la vida con la enfermedad del VIH, de una manera más accesible. Todas estas publicaciones están disponibles a través del *PI Hotline*.

Project Inform tiene información sobre muchos temas, incluyendo:

Estrategias Antivirales

El médico, el paciente y el VIH

El primer día... después de resultar seropositivo

Diagnósticos: Herramientas útiles para el control del VIH

Las enfermedades oportunistas

La nutrición y el control del peso

... y muchos más!

Esta lista es actualizada de acuerdo al desarrollo de nueva información, pero no incluye todo el material que se encuentra disponible. Para mayor información, por favor diríjase al website que indicamos más abajo.



1-800-822-7422

[www.projectinform.org](http://www.projectinform.org)



Para contactar el Project Inform puede hacerlo de las siguientes maneras:

Hotline Nacional 800-822-7422

Hotline San Francisco y Internacional 415-558-9051

Administrative Offices 415-558-8669 FAX 415-558-0684 WEBSITE [www.projectinform.org](http://www.projectinform.org)

© 2003 Project Inform, Inc., 205 13th Street #2001, San Francisco, CA 94103-2461